

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА
Листовка - Приложение 2
Към Рег. № 20110133
Разрешение № 18714 / 09.07.2012
Одобрен № /

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

PANADOL ОПТИЗОРБ 500mg film-coated tablets
ПАНАДОЛ OPTIZORB 500mg филмирани таблетки

Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ Оптизорб И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Панадол Оптизорб 500mg филмирани таблетки е обезболяващо и температуропонижаващо средство и се използва за симптоматично лечение на повечето състояния, свързани с лека до умерена болка и висока температура, напр. главоболие, включително мигрена, зъбобол, болки в гърба, ревматични и мускулни болки, менструални болки, болки при възпалено гърло.

Как действа ПАНАДОЛ Оптизорб?

Панадол Оптизорб 500mg филмирани таблетки съдържа парацетамол – аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). Панадол Оптизорб 500mg филмирани таблетки не дразни стомаха и таблетките са с форма на капсула, което улеснява тяхното преглъщане.

Панадол Оптизорб 500mg филмирани таблетки съдържа система за разпадане на таблетката, която ускорява разтварянето и така осигурява поне с 37% по-бързо начало на действието, сравнено със стандартни таблетки с парацетамол.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ПАНАДОЛ Оптизорб

Запомнете: ПАНАДОЛ Оптизорб съдържа парацетамол.

Не приемайте с други лекарства, съдържащи парацетамол.

Не взимайте Панадол Оптизорб, ако сте алергични към парацетамол или някоя от другите съставки.

Съдържа парахидроксибензоати, които могат да причинят алергична реакция.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете ПАНАДОЛ Оптизорб, ако:

- имате бъбречно или чернодробно заболяване;
- взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин;
- взимате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- трябва да взимате обезболяващо средство всеки ден за продължителен период;



- сте имали проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото;
- сте бременна или кърмите.

Бременност и кърмене

Епидемиологичните проучвания при бременност при човека не показват риск при употребата на парацетамол в препоръчаните дози.

Парацетамол се екскретира в майчиното мляко, но не в клинично значими количества. Наличните данни не показват, че парацетамол е противопоказан по време на кърмене.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Оптизорб?

За перорално приложение.

Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:

2 (две) таблетки на всеки 4 часа при необходимост. Не взимайте на интервали по-кратки от 4 часа и не надвишавайте 8 таблетки (4000mg парацетамол) за период от 24 часа.

Деца (от 6 до 12 години) – ½ (половин) до 1 (една) таблетка да се дава на всеки 4 часа при необходимост. Не трябва да се дават повече от 4 (четири) таблетки за 24 часа.

Не давайте на деца повече от 3 (три) дни без консултация с лекар.

Да не се дава на деца под 6 годишна възраст.

Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.

Да не се превишава препоръчаната доза.

Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?

Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.

Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да приемете необходимата доза?

Приемете дозата когато си спомните. Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
- се появат язви в устата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
- имате неочаквано кървене или склонност към насиняване.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ Оптизорб

Да се пази на място, недостъпно за деца.



Да се съхранява при температура под 30°C.
Не използвайте след датата, посочена на опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарства с битовите отпадъци или в канализацията. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните лекарства и така ще спомогнете за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ПАНАДОЛ Оптизорб?

Всяка таблетка съдържа парацетамол 500mg

Също така съдържа прежелатинизирано нишесте, калциев карбонат, алгинова киселина, кросповидон, повидон, магнезиев стеарат, колоиден безводен силициев диоксид и натриев метил (E219), натриев етил (E215) и натриев пропил (E217) парахидроксибензоат.

За таблетната обвивка: опадри бял, карнауба восък, дестилирана вода.

Как изглежда ПАНАДОЛ Оптизорб и какво съдържа опаковката?

Панадол Оптизорб са бели до леко кремави филмирани таблетки с формата на капсула с гладки ръбове, релефно „P” в кръг от едната страна и с делителна черта от другата. Опаковката може да съдържа 12, 16, 24, 30 или 32 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба е:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
GlaxoSmithKline Export Ltd.
Brentford, TW8 9GS, Обединено кралство

Производители:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,
Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия

и/или

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
71083 Herrenberg, Германия

и/или

Catalent UK Packaging Ltd.,
Sedge Close, headway, Great Oakley, Corby
Northamptonshire, Обединено кралство

и/или

S.C. EUROPHARM S.A.
2 Panselilor St., Brasov 500419, Румъния

Срок на годност – 3 години.
Без лекарско предписание.

Последна актуализация – август 2011

GSK logo

Panadol* е регистрирана търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

